



Standard-Impfschutz, der grundsätzlich vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie bestehen sollte

Hierbei handelt es sich um generell empfohlene Standardimpfungen, die in Deutschland entsprechend dem Impfkalender der ständigen Impfkommission (STIKO) durchgeführt werden sollten. Die Verabreichung dieser Impfungen erfolgt optimal möglichst früh nach Diagnosestellung eines Morbus Crohn oder einer Colitis ulcerosa und noch **VOR** Beginn der immunsuppressiven Therapie. Der Einsatz von Kombinationsimpfstoffen gegen mehrere Erreger wird empfohlen.

| Empfohlene Impfungen in Anlehnung an die STIKO für folgende Erkrankungen | Art des Impfstoffes | Impfung auch während der immunsuppressiven Therapie möglich? |
|--|---------------------|--|
| Diphtherie | Totimpfstoff | Ja |
| Haemophilus influenzae Serotyp B | Totimpfstoff | Ja |
| Hepatitis B | Totimpfstoff | Ja |
| Humane Papillomviren (Typen 16, 18 bzw. 6, 11, 16, 18) | Totimpfstoff | Ja |
| Influenza | Totimpfstoff | Ja |
| Masern, Mumps, Röteln Kombinationsimpfstoff | Lebendimpfstoff | Nein |
| Meningokokken Serotyp C | Totimpfstoff | Ja |
| Pertussis | Totimpfstoff | Ja |
| Pneumokokken | Totimpfstoff | Ja |
| Poliomyelitis | Totimpfstoff | Ja |
| Tetanus | Totimpfstoff | Ja |
| Varizellen | Lebendimpfstoff | Nein |

Reiseimpfungen bei Personen unter immunsuppressiver Therapie

| Empfohlene Impfungen in Anlehnung an die STIKO für folgende Erkrankungen | Art des Impfstoffes | Impfung auch während der immunsuppressiven Therapie möglich? |
|--|---------------------|--|
| Hepatitis A | Totimpfstoff | Ja |
| Typhus | Totimpfstoff | Ja |
| Cholera | Totimpfstoff | Ja |
| Tollwut | Totimpfstoff | Ja |
| Frühsommer Meningoenzephalitis (FSME) | Totimpfstoff | Ja |
| Meningokokken-Infektionen (Serogruppen ACWY) | Totimpfstoff | Ja |
| Gelbfieber | Lebendimpfstoff | Nein |